

## MESOTELIOMA MALIGNO PLEURICO Regione Piemonte, 1990-2018

**Mesotelioma maligno pleurico. Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (per 100.000 per anno; standard: popolazione europea EU27) e intervallo di confidenza (IC) al 95%, per sesso e periodo di calendario.**

| <b>INCIDENZA 1990-2018 (diagnosi certe, probabili, possibili)</b> |               |                             |               |              |                             |               |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|
|   | <b>Uomini</b> |                             |               | <b>Donne</b> |                             |               |
| <b>Periodo</b>  | <b>Casi</b>   | <b>Tasso standardizzato</b> | <b>IC 95%</b> | <b>Casi</b>  | <b>Tasso standardizzato</b> | <b>IC 95%</b> |
| 1990-1994   | 245           | 2.7                         | 2.4-3.1       | 140          | 1.2                         | 1.0-1.4       |
| 1995-1999   | 446           | 4.8                         | 4.3-5.2       | 238          | 1.9                         | 1.7-2.2       |
| 2000-2004   | 589           | 5.9                         | 5.4-6.4       | 345          | 2.6                         | 2.3-2.9       |
| 2005-2009   | 670           | 6.3                         | 5.8-6.7       | 376          | 2.7                         | 2.4-2.9       |
| 2010-2014   | 737           | 6.5                         | 6.0-6.9       | 359          | 2.3                         | 2.1-2.6       |
| 2015-2018   | 662           | 6.8                         | 6.3-7.3       | 336          | 2.6                         | 2.3-2.9       |

| <b>INCIDENZA 1990-2018 (diagnosi certe)</b> |               |                             |               |              |                             |               |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|
|   | <b>Uomini</b> |                             |               | <b>Donne</b> |                             |               |
| <b>Periodo</b>                              | <b>Casi</b>   | <b>Tasso standardizzato</b> | <b>IC 95%</b> | <b>Casi</b>  | <b>Tasso standardizzato</b> | <b>IC 95%</b> |
| 1990-1994                                   | 185           | 2.0                         | 1.7-2.3       | 113          | 1.0                         | 0.8-1.2       |
| 1995-1999                                   | 330           | 3.4                         | 3.0-3.8       | 153          | 1.3                         | 1.1-1.5       |
| 2000-2004                                   | 417           | 4.0                         | 3.6-4.4       | 222          | 1.7                         | 1.5-2.0       |
| 2005-2009                                   | 502           | 4.6                         | 4.2-5.0       | 251          | 1.9                         | 1.6-2.1       |
| 2010-2014                                   | 615           | 5.3                         | 4.9-5.8       | 285          | 1.9                         | 1.7-2.2       |
| 2015-2018                                   | 547           | 5.6                         | 5.2-6.1       | 266          | 2.2                         | 1.9-2.5       |

**Mesotelioma maligno pleurico. Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (per 100.000 per anno) e intervalli di confidenza (IC) al 95%, per sesso e ASL di residenza, nell'ultimo quinquennio disponibile (2014-2018).**

| <b>INCIDENZA 2014-2018 (diagnosi certe, probabili, possibili)</b> |               |                             |               |              |                             |               |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|
|   | <b>UOMINI</b> |                             |               | <b>DONNE</b> |                             |               |
| <b>ASL</b>  | <b>Casi</b>   | <b>Tasso standardizzato</b> | <b>IC 95%</b> | <b>Casi</b>  | <b>Tasso standardizzato</b> | <b>IC 95%</b> |
| AL  | 233           | 17.8                        | 15.5-20.0     | 149          | 8.9                         | 7.4-10.4      |
| AT  | 29            | 5.0                         | 3.2-6.8       | 13           | 1.7                         | 0.8-2.7       |
| BI  | 27            | 5.1                         | 3.2-7.1       | 8            | 1.3                         | 0.4-2.2       |
| CN1   | 44            | 3.8                         | 2.7-5.0       | 13           | 1.0                         | 0.4-1.6       |
| CN2   | 16            | 3.5                         | 1.8-5.2       | 5            | 0.9                         | 0.1-1.8       |
| NO  | 54            | 6.0                         | 4.4-7.6       | 29           | 2.3                         | 1.5-3.2       |
| TO  | 126           | 5.4                         | 4.4-6.3       | 67           | 1.8                         | 1.3-2.3       |
| TO3   | 88            | 5.5                         | 4.3-6.6       | 46           | 2.2                         | 1.6-2.8       |
| TO4   | 52            | 5.8                         | 4.5-7.0       | 32           | 1.7                         | 1.1-2.3       |
| TO5   | 39            | 4.8                         | 3.3-6.3       | 21           | 2.0                         | 1.2-2.9       |
| VC  | 38            | 7.7                         | 5.3-10.2      | 15           | 2.3                         | 1.1-3.5       |
| VCO   | 42            | 11.1                        | 7.8-14.5      | 16           | 3.0                         | 1.5-4.5       |


**Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati e intervallo di confidenza (IC) al 95%, per sesso e area geografica.**

| INCIDENZA 2014-2018 diagnosi morfologica (casi certi) |       |        |      |             |        |        |      |             |
|---|-------|--------|------|-------------|--------|--------|------|-------------|
| DISTRETTI   | DONNE |        |      |             | UOMINI |        |      |             |
|   | tassi | IC 95% |      | n.osservati | tassi  | IC 95% |      | n.osservati |
| Regione Piemonte                                      | 2.2   | 1.9    | 2.4  | 331         | 5.6    | 5.2    | 6.0  | 675         |
| AL/1 (Acqui Terme)                                    | 0.6   | 0      | 1.6  | 1           | 4.6    | 0.9    | 8.3  | 6           |
| AL/2 (Alessandria)                                    | 2.2   | 0.7    | 3.7  | 9           | 7.5    | 4.6    | 10.5 | 26          |
| AL/3 (Casale Monferrato)                              | 32.3  | 25.7   | 38.9 | 97          | 53.3   | 44.1   | 62.5 | 130         |
| Comune Casale Monferrato                              | 50.0  | 37.4   | 62.7 | 63          | 68.6   | 51.8   | 85.3 | 65          |
| AL/4 (Novi Ligure)                                    | 1.7   | 0      | 3.4  | 4           | 7.1    | 3.6    | 10.6 | 16          |
| AL/5 (Ovada)  | 2.4   | 0      | 5.8  | 2           | 7.6    | 1.9    | 13.2 | 7           |
| AL/6 (Tortona)  | 0.3   | 0      | 0.9  | 1           | 3.7    | 1.0    | 6.5  | 7           |
| AL/7 (Valenza)  | 5.0   | 0.6    | 9.3  | 5           | 3.5    | 5.8    | 21.2 | 12          |
| AT/1 (Asti centro)                                    | 1.8   | 0.2    | 3.3  | 5           | 5.1    | 2.1    | 8.1  | 11          |
| AT/2 (Asti nord)                                      | 1.4   | 0      | 3.0  | 3           | 4.6    | 1.6    | 7.6  | 9           |
| AT/3 (Asti sud-Nizza M.to)                            | 0.3   | 0      | 0.8  | 1           | 2.9    | 0.3    | 5.5  | 5           |
| BI/1(Biella)  | 1.2   | 0.1    | 2.3  | 5           | 3.8    | 1.7    | 5.9  | 13          |
| BI/2 (Cossato)  | 1.0   | 0      | 2.3  | 2           | 6.2    | 2.5    | 9.9  | 11          |
| CN1/1 (Borgo San Dalmazzo)                            | 0.4   | 0      | 1.2  | 1           | 3.4    | 1.0    | 5.7  | 8           |
| CN1/2 (Ceva)  | 1.4   | 0      | 4.2  | 1           | 1.2    | 0      | 3.6  | 1           |
| CN1/3 (Cuneo)   | 1.2   | 0      | 2.7  | 3           | 5.1    | 1.9    | 8.3  | 10          |
| CN1/4 (Fossano)                                       | 0.4   | 0      | 1.3  | 1           | 3.8    | 1.3    | 6.3  | 9           |
| CN1/5 (Mondovi)                                       | 1.4   | 0      | 3.1  | 3           | 3.8    | 1.0    | 6.7  | 7           |
| CN1/6 (Saluzzo)                                       | 0.4   | 0      | 1.3  | 1           | 1.8    | 0      | 3.6  | 4           |
| CN2/1 (Alba)  | 0.9   | 0      | 1.9  | 3           | 2.7    | 0.8    | 4.5  | 8           |
| CN2/2 (Bra)   | 1.0   | 0      | 2.4  | 2           | 3.0    | 0.3    | 5.7  | 5           |
| NO/1 (Arona)  | 2.1   | 0.4    | 3.8  | 6           | 4.7    | 1.8    | 7.7  | 10          |
| NO/2 (Borgomanero)                                    | 0.8   | 0      | 2.0  | 2           | 4.7    | 1.6    | 7.7  | 9           |
| NO/3 (Galliate-Trecate)                               | 2.4   | 0.2    | 4.6  | 5           | 8.7    | 4.0    | 13.5 | 13          |
| NO/4 (Novara)   | 2.7   | 1.2    | 4.3  | 12          | 4.5    | 2.3    | 6.8  | 16          |
| TO (Torino)   | 1.6   | 1.1    | 2.0  | 53          | 4.4    | 3.5    | 5.2  | 102         |
| TO3/1 (Collegno)                                      | 4.3   | 2.1    | 0.6  | 14          | 6.4    | 3.3    | 9.6  | 16          |
| TO3/2 (Giaveno)                                       | 1.2   | 0      | 3.5  | 1           | 3.6    | 0      | 7.6  | 3           |
| TO3/3 (Orbassano)                                     | 2.9   | 1.0    | 4.8  | 9           | 3.0    | 0.9    | 5.2  | 8           |
| TO3/4 (Pinerolo)                                      | 1.1   | 0      | 2.4  | 3           | 3.1    | 0.9    | 5.2  | 8           |
| TO3/5 (Rivoli)  | 1.5   | 0      | 3.1  | 3           | 4.1    | 1.0    | 7.2  | 7           |
| TO3/6 (Susa)  | 1.8   | 0.3    | 3.2  | 6           | 2.3    | 0.5    | 4.1  | 6           |
| TO3/7 (Val Pellice)                                   | 2.2   | 0      | 5.4  | 2           | 4.6    | 0      | 9.9  | 3           |
| TO3/8 (Val Chisone e Germanasca)                      | 0     | 0      | 0    | 0           | 0      | 0      | 0    | 0           |
| TO3/9 (Venaria)                                       | 0.4   | 0      | 1.2  | 1           | 5.0    | 2.0    | 8.1  | 11          |
| TO4/1 (Ciriè)   | 2.1   | 0.6    | 3.5  | 8           | 4.2    | 2.0    | 6.5  | 14          |
| TO4/2 (Chivasso)                                      | 2.6   | 0.6    | 4.5  | 7           | 7.1    | 3.5    | 10.8 | 15          |
| TO4/3 (Settimo Torinese)                              | 0.7   | 0      | 1.7  | 2           | 2.5    | 0.5    | 4.5  | 6           |
| TO4/4 (San Mauro Torinese)                            | 0     | 0      | 0    | 0           | 1.7    | 0      | 4.0  | 2           |
| TO4/5 (Ivrea)   | 1.3   | 0.1    | 2.4  | 5           | 6.3    | 3.6    | 9.0  | 21          |
| TO4/6 (Cuorgnè)                                       | 0.5   | 0      | 1.2  | 2           | 3.6    | 1.1    | 6.0  | 8           |
| TO5/1(Carmagnola)                                     | 1.3   | 0      | 3.0  | 2           | 2.3    | 0      | 4.8  | 3           |
| TO5/2 (Chieri)  | 1.9   | 0.4    | 3.4  | 6           | 2.9    | 0.9    | 4.9  | 8           |
| TO5/3 (Moncalieri)                                    | 2.7   | 0.7    | 4.7  | 7           | 7.7    | 3.9    | 11.5 | 16          |
| TO5/4 (Nichelino)                                     | 0.8   | 0      | 2.0  | 2           | 3.2    | 0.8    | 5.5  | 7           |
| VC/1(Vercelli-Santhià)                                | 2.7   | 1.0    | 4.5  | 10          | 7.5    | 4.3    | 10.8 | 21          |
| VC/2 (Montano-Borghesia-Varallo)                      | 0.5   | 0      | 1.3  | 1           | 4.7    | 1.8    | 7.6  | 10          |
| VCO/1(Domodossola)                                    | 1.5   | 0      | 3.3  | 3           | 9.6    | 4.5    | 14.6 | 14          |
| VCO/2 (Omegna)  | 2.7   | 0      | 5.7  | 3           | 1.1    | 0      | 3.2  | 1           |
| VCO/3 (Verbania)                                      | 3.1   | 0      | 5.7  | 6           | 8.2    | 3.6    | 12.9 | 12          |


**Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati e intervallo di confidenza (IC) al 95%, per sesso e area geografica.**



| INCIDENZA 2014-2018 tutte le diagnosi (casi certi, probabili, possibili) |       |        |      |             |        |        |      |             |
|--|-------|--------|------|-------------|--------|--------|------|-------------|
| DISTRETTI  | DONNE |        |      |             | UOMINI |        |      |             |
|  | tassi | ic 95% |      | n.osservati | tassi  | ic 95% |      | n.osservati |
| Regione Piemonte   | 2.5   | 2.3    | 2.8  | 414         | 6.8    | 6.3    | 7.3  | 818         |
| AL/1 (Acqui Terme)   | 0.9   | 0      | 2.1  | 2           | 4.6    | 0.9    | 8.3  | 6           |
| AL/2 (Alessandria)   | 3.2   | 1.4    | 4.9  | 14          | 8.4    | 5.3    | 11.4 | 29          |
| AL/3 (Casale Monferrato)   | 36.8  | 29.9   | 43.7 | 119         | 59.2   | 49.5   | 68.9 | 144         |
| Comune Casale Monferrato   | 57.3  | 44.1   | 70.5 | 77          | 74.6   | 57.0   | 92.1 | 70          |
| AL/4 (Novi Ligure)   | 1.9   | 0.2    | 3.7  | 5           | 9.4    | 5.4    | 13.5 | 21          |
| AL/5 (Ovada)   | 2.4   | 0      | 5.8  | 2           | 7.6    | 1.9    | 13.2 | 7           |
| AL/6 (Tortona)   | 0.3   | 0      | 0.9  | 1           | 4.7    | 1.6    | 7.8  | 9           |
| AL/7 (Valenza)   | 5.5   | 1.0    | 10.0 | 6           | 19.1   | 9.9    | 28.2 | 17          |
| AT/1 (Asti centro)   | 2.0   | 0.4    | 3.7  | 6           | 5.5    | 2.4    | 8.7  | 12          |
| AT/2 (Asti nord)   | 2.1   | 0.2    | 4.0  | 5           | 5.6    | 2.3    | 8.9  | 11          |
| AT/3 (Asti sud-Nizza M.to)   | 0.9   | 0      | 2.3  | 2           | 3.6    | 0.7    | 6.5  | 6           |
| BI/1(Biella)   | 1.5   | 0.3    | 2.7  | 6           | 4.1    | 1.9    | 6.2  | 14          |
| BI/2 (Cossato)   | 1.0   | 0      | 2.3  | 2           | 7.3    | 3.3    | 11.3 | 13          |
| CN1/1 (Borgo San Dalmazzo)   | 0.4   | 0      | 1.2  | 1           | 3.4    | 1.0    | 5.7  | 8           |
| CN1/2 (Ceva)   | 2.2   | 0      | 5.3  | 2           | 1.2    | 0      | 3.6  | 1           |
| CN1/3 (Cuneo)  | 1.2   | 0      | 2.7  | 3           | 5.6    | 2.3    | 8.9  | 11          |
| CN1/4 (Fossano)  | 1.1   | 0      | 2.4  | 3           | 4.8    | 1.9    | 7.6  | 11          |
| CN1/5 (Mondovi)  | 1.4   | 0      | 3.1  | 3           | 5.0    | 1.7    | 8.2  | 9           |
| CN1/6 (Saluzzo)  | 0.4   | 0      | 1.3  | 1           | 1.8    | 0      | 3.6  | 4           |
| CN2/1 (Alba)   | 0.9   | 0      | 1.9  | 3           | 3.4    | 1.3    | 5.5  | 10          |
| CN2/2 (Bra)  | 1.0   | 0      | 2.4  | 2           | 3.6    | 0.7    | 6.5  | 6           |
| NO/1 (Arona)   | 2.1   | 0.4    | 3.8  | 6           | 5.6    | 2.4    | 8.8  | 12          |
| NO/2 (Borgomanero)   | 1.3   | 0      | 2.7  | 4           | 5.7    | 2.3    | 9.1  | 11          |
| NO/3 (Galliate-Trecate)  | 2.4   | 0.2    | 4.6  | 5           | 9.4    | 4.5    | 14.4 | 14          |
| NO/4 (Novara)  | 3.0   | 1.4    | 4.6  | 14          | 4.8    | 2.5    | 7.1  | 17          |
| TO (Torino)  | 1.8   | 1.3    | 2.3  | 67          | 5.4    | 4.4    | 6.3  | 126         |
| TO3/1 (Collegno)   | 1.3   | 2.1    | 6.6  | 14          | 8.4    | 4.8    | 12.1 | 21          |
| TO3/2 (Giaveno)  | 1.2   | 0      | 3.5  | 1           | 4.7    | 0.1    | 9.3  | 4           |
| TO3/3 (Orbassano)  | 2.9   | 1.0    | 4.8  | 9           | 5.7    | 2.6    | 8.7  | 14          |
| TO3/4 (Pinerolo)   | 1.1   | 0      | 2.4  | 3           | 3.5    | 1.2    | 5.8  | 9           |
| TO3/5 (Rivoli)   | 2.3   | 0.3    | 4.3  | 5           | 5.4    | 1.8    | 9.0  | 9           |
| TO3/6 (Susa)   | 2.5   | 0.8    | 4.1  | 9           | 5.1    | 2.2    | 8.0  | 12          |
| TO3/7 (Val Pellice)  | 2.2   | 0      | 5.4  | 2           | 7.1    | 0.8    | 13.3 | 5           |
| TO3/8 (Val Chisone e Germanasca)   | 0.8   | 0      | 2.3  | 1           | 1.4    | 0      | 4.2  | 1           |
| TO3/9 (Venaria)  | 0.7   | 0      | 1.7  | 2           | 6.0    | 2.7    | 9.4  | 13          |
| TO4/1 (Ciriè)  | 2.6   | 1.1    | 4.2  | 11          | 5.7    | 3.1    | 8.2  | 19          |
| TO4/2 (Chivasso)   | 3.2   | 1.1    | 5.3  | 9           | 8.8    | 4.7    | 12.9 | 18          |
| TO4/3 (Settimo Torinese)   | 1.4   | 0      | 2.7  | 4           | 3.6    | 1.1    | 6.1  | 8           |
| TO4/4 (San Mauro Torinese)   | 0     | 0      | 0    | 0           | 2.5    | 0      | 5.4  | 3           |
| TO4/5 (Ivrea)  | 1.3   | 0.1    | 2.4  | 5           | 7.3    | 4.4    | 10.3 | 24          |
| TO4/6 (Cuornè)   | 0.9   | 0      | 1.9  | 3           | 4.5    | 1.7    | 7.4  | 10          |
| TO5/1 (Carmagnola)   | 1.3   | 0      | 3.0  | 2           | 2.3    | 0      | 4.8  | 3           |
| TO5/2 (Chieri)   | 2.1   | 0.5    | 3.6  | 7           | 4.5    | 1.9    | 7.0  | 12          |
| TO5/3 (Moncalieri)   | 3.0   | 0.9    | 5.1  | 8           | 8.2    | 4.3    | 12.1 | 17          |
| TO5/4 (Nichelino)  | 1.6   | 0      | 3.2  | 4           | 3.2    | 0.8    | 5.5  | 7           |
| VC/1 (Vercelli-Santhià)  | 3.4   | 1.5    | 5.4  | 13          | 9.0    | 5.4    | 12.5 | 25          |
| VC/2 (Montano-Borghesia-Varallo)   | 0.7   | 0      | 1.6  | 2           | 6.0    | 2.7    | 9.3  | 13          |
| VCO/1(Domodossola)   | 1.5   | 0      | 3.3  | 3           | 12.6   | 6.7    | 18.4 | 18          |
| VCO/2 (Omegna)   | 3.7   | 0.4    | 7.1  | 5           | 2.1    | 0      | 5.1  | 2           |
| VCO/3 (Verbania)   | 3.9   | 1.1    | 6.8  | 8           | 15.6   | 9.0    | 22.1 | 22          |




**Mesotelioma maligno pleurico. Trend temporali di incidenza per sesso. Tutti i livelli di certezza diagnostica (Regione Piemonte, 1990-2018)**









**Mesotelioma maligno pleurico. Trend temporali di incidenza, per sesso e ASL. Tutti i livelli di certezza diagnostica, 1990-2018**













## SOPRAVVIVENZA

### Mediana di sopravvivenza e probabilità di sopravvivenza per periodo di calendario

| SOPRAVVIVENZA 1990-2018 |           |                   |                                  |        |        |        |        |
|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| periodo                 |           | mediana<br>(mesi) | Probabilità di sopravvivenza a : |        |        |        |        |
|                         |           |                   | 6 mesi                           | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|                         | 1990-1994 | 8.6               | 64%                              | 35%    | 15%    | 8%     | 3%     |
|                         | 1995-1999 | 8.7               | 61%                              | 39%    | 16%    | 8%     | 4%     |
|                         | 2000-2004 | 10.0              | 66%                              | 41%    | 17%    | 9%     | 4%     |
|                         | 2005-2009 | 11.1              | 71%                              | 47%    | 20%    | 12%    | 5%     |
|                         | 2010-2014 | 11.0              | 70%                              | 46%    | 20%    | 11%    | 5%     |
|                         | 2015-2018 | 11.0              | 68%                              | 46%    | 21%    | 11%    | 6%     |

### Mediana di sopravvivenza e probabilità di sopravvivenza per classe d'età

| SOPRAVVIVENZA 1990-2018 |       |                   |                                  |        |        |        |        |
|-------------------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| classe d'età            |       | mediana<br>(mesi) | Probabilità di sopravvivenza a : |        |        |        |        |
|                         |       |                   | 6 mesi                           | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|                         | 00-54 | 13.5              | 81%                              | 54%    | 29%    | 19%    | 9%     |
|                         | 55-64 | 13.6              | 78%                              | 56%    | 26%    | 15%    | 7%     |
|                         | 65-74 | 12.3              | 74%                              | 51%    | 22%    | 11%    | 5%     |
|                         | 75+   | 7.1               | 54%                              | 30%    | 11%    | 6%     | 2%     |

### Mediana di sopravvivenza e probabilità di sopravvivenza per istotipo

| SOPRAVVIVENZA 1990-2018 |                 |                   |                                  |        |        |        |        |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| istotipo                |                 | mediana<br>(mesi) | Probabilità di sopravvivenza a : |        |        |        |        |
|                         |                 |                   | 6 mesi                           | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|                         | epiteliomorfo   | 14.1              | 80%                              | 57%    | 26%    | 14%    | 6%     |
|                         | bifasico        | 9.5               | 69%                              | 37%    | 13%    | 5%     | 2%     |
|                         | sarcomatoso     | 4.8               | 41%                              | 17%    | 5%     | 3%     | 2%     |
|                         | non specificato | 6.9               | 55%                              | 31%    | 12%    | 7%     | 4%     |
|                         | non noto        | 3.1               | 31%                              | 16%    | 9%     | 6%     | 3%     |