



N. lesioni trattate e rapporto B/M




1. Cancri con diagnosi preoperatoria (B5/C5)




N=17741 – Trend temporale 2001–2017

1. Cancri con diagnosi preoperatoria (B5/C5)




Risultato 87.6%, 9 dipartimenti, N=1370, 0.4% missing

2a. Invasivi con tipo istologico, grading, ER/PgR, stage e dimensioni registrati




N=15162 – Trend temporale 2001–2017

2a. Invasivi con tipo istologico, grading, ER/PgR, stage e dimensioni registrati




Risultato 80.1%, 9 dipartimenti, N=1146, 0% missing

2b. Non invasivi con grado e tipo istologico registrati




N=2668 – Trend temporale 2001–2017

2b. Non invasivi con grado e tipo istologico registrati




Risultato 95.1%, 9 dipartimenti, N=224, 0% missing

4. Rx pezzo in 2 proiez. perpend. nei casi con sole microcalcificazioni




N=2535 – Trend temporale 2001–2017

4. Rx pezzo in 2 proiez. perpend. nei casi con sole microcalcificazioni




Risultato 94.5%, 6 dipartimenti, N=185, 1.1% missing

5a. Trattamento entro 30 giorni dalla indicazione terapeutica




N=18280 – Trend temporale 2001–2017

5a. Trattamento entro 30 giorni dalla indicazione terapeutica




Risultato 37.9%, 8 dipartimenti, N=1421, 9.4% missing

5b. Trattamento entro 42 giorni dal primo esame di approfondimento diagnostico




N=18703 – Trend temporale 2001–2017

5b. Trattamento entro 42 giorni dal primo esame di approfondimento diagnostico




Risultato 19.8%, 9 dipartimenti, N=1521, 4.5% missing

5c. Trattamento entro 60 giorni dalla mammografia di screening




N=18183 – Trend temporale 2001–2017

5c. Trattamento entro 60 giorni dalla mammografia di screening




Risultato 26.2%, 9 dipartimenti, N=1508, 4.1% missing

6a. Unico intervento chirurgico per il trattamento del carcinoma invasivo




N=14997 – Trend temporale 2001–2017

6a. Unico intervento chirurgico per il trattamento del carcinoma invasivo




Risultato 96.9%, 9 dipartimenti, N=1131, 0.8% missing

6b. Unico intervento chirurgico per il trattamento del carcinoma non invasivo




N=2644 – Trend temporale 2001–2017

6b. Unico intervento chirurgico per il trattamento del carcinoma non invasivo




Risultato 95%, 9 dipartimenti, N=224, 0.9% missing

7. Almeno 10 linfonodi asportati nella dissezione ascellare (escluso sampling)




N=4863 – Trend temporale 2001–2017

7. Almeno 10 linfonodi asportati nella dissezione ascellare (escluso sampling)




Risultato 87.8%, 9 dipartimenti, N=193, 2.1% missing

8. Esame solo del linfonodo/i sentinella nei casi che poi risulteranno pN0




N=8887 – Trend temporale 2001–2017

8. Esame solo del linfonodo/i sentinella nei casi che poi risulteranno pN0




Risultato 96.2%, 8 dipartimenti, N=688, 4.7% missing

9. No dissezione ascellare (di qualsiasi livello, sampling incluso) nei carcinomi non invasivi




N=2426 – Trend temporale 2001–2017

9. No dissezione ascellare (di qualsiasi livello, sampling incluso) nei carcinomi non invasivi




Risultato 98.9%, 7 dipartimenti, N=192, 1% missing

10. Asportazione di max 3 linfonodi nell'esame dell'ascella con linfonodo sentinella




N=12926 – Trend temporale 2001–2017

10. Asportazione di max 3 linfonodi nell'esame dell'ascella con linfonodo sentinella




Risultato 98.3%, 8 dipartimenti, N=1035, 4.1% missing

11. Int. conservativo in carcinomi invasivi fino a 3 cm (inclusa componente non invasiva)




N=13164 – Trend temporale 2001–2017

11. Int. conservativo in carcinomi invasivi fino a 3 cm (inclusa componente non invasiva)




Risultato 84.2%, 9 dipartimenti, N=1009, 2.8% missing

12. Intervento conservativo in carcinomi in situ fino a 2 cm



N=1318 – Trend temporale 2001–2017

12. Intervento conservativo in carcinomi in situ fino a 2 cm



Risultato 87%, 9 dipartimenti, N=116, 0.9% missing

Indicatori di diagnosi e terapia

