



Centro di Riferimento per l'Epidemiologia
e la Prevenzione Oncologica in Piemonte

www.cpo.it


La sorveglianza post-polipectomia




A large, semi-transparent watermark of the CPO logo is centered on the slide. The letters "CPO" are in a light gray font, surrounded by the same orange curved lines as the main logo. The watermark is positioned behind the title and author information.
Carlo Senore
Marco Silvani
Marco Calcagno

Carico endoscopico


Distribuzione delle colonscopie, per tipologia




Raccomandazione dopo CT negativa FIT




Raccomandazione dopo CT negativa FS




Raccomandazione dopo Adenoma a basso rischio



Raccomandazione dopo adenomi a rischio intermedio



Raccomandazione dopo adenomi a rischio elevato




Conclusioni

- Si conferma la variabilità nelle raccomandazioni per la sorveglianza
- Il carico di lavoro indotto rappresenta una quota sostanziale dell'attività di screening svolta dai servizi di endoscopia
- Occorre monitorare l'utilizzo della CTC e la pratica di ripetere l'esame

EPoS trials

European Polyp Surveillance

Baseline colonoscopy (all polyps removed)





Centro di Riferimento per l'Epidemiologia
e la Prevenzione Oncologica in Piemonte

www.cpo.it

Grazie per l'attenzione!

carlo.senore@cpo.it